



VACUNAS CONTRA COVID-19: LO QUE NECESITAS SABER



Hay tres vacunas disponibles: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.



Pfizer y Moderna son vacunas de ARNm y requieren dos dosis



Johnson & Johnson es una vacuna de vector viral y requiere una dosis

Las vacunas han pasado por múltiples sistemas de monitoreo para garantizar que sean seguras.



Ensayos clínicos



Análisis por expertos



Aprobación de la FDA



Monitoreo continuo

Puede experimentar efectos secundarios leves durante unos días después de recibir la vacuna.



Dolor o hinchazón en el brazo



Cansancio



Dolor de cabeza



Dolor muscular



Escalofríos o fiebre

Si experimenta dolor o malestar después de vacunarse, siga estos consejos:



Aplique un paño limpio, fresco y húmedo sobre su brazo



Beba muchos líquidos y use ropa ligera



Llame a su médico si sus síntomas empeoran o no desaparecen



VACUNAS CONTRA COVID-19: DESPUÉS DE VACUNARTE



Es posible que necesite una segunda dosis.

Si recibió la vacuna Pfizer o Moderna, debe recibir una segunda dosis dentro de 3 a 4 semanas después de su primera dosis para alcanzar la máxima protección de la vacuna.



Toma tiempo para desarrollar protección de la vacuna.

Si recibió una vacuna de dos dosis, toma dos semanas después de su segunda dosis para estar completamente protegido contra el virus. Para una vacuna de una dosis, se toma dos semanas después de la primera dosis para estar protegido.



Siga tomando precauciones.

Aunque las vacunas son muy efectivas para prevenir COVID-19, aún podría enfermarse y contagiar a otros. El CDC recomienda que las personas vacunadas sigan usando máscaras y practiquen el distanciamiento físico en los lugares públicos.



Ayuda a otros a vacunarse.

Si conoce a alguien que es elegible para recibir la vacuna pero necesita ayuda, tómale una foto al código QR o llame al 1-800-525-0127 para ayudarlo a encontrar un sitio de vacunación y programar una cita.